

Wyniki odłowów kontrolnych

1. **Trzęsa** – (53.378869 16.793993) - niewielki ciek płynący w lesie; w wielu miejscach tamy bobrowe; dno muliste, miejscami piaszczyste; gł. 0,1 – 0,3 m; miejscami rozlewa się za piętrzeniami i stagnuje; brak ryb
2. **Młynówka** – (53.377326 16.799545) - ciek płynący przez obszary łąkowe i leśne; wartki nurt, woda czysta, dno piaszczyste; szer. koryta ok. 5 m; ciek ubogi w schronienia dla ryb. Zbadano ok. 300 m cieku. Stwierdzono ciernika, cierniczka, płoć – mało ryb.
3. **Płynica** – (53.324494 16.765787) - naturalny i urozmaicony morfologicznie ciek, płynący wśród lasu łęgowego; wartki przepływ; koryto 5-8 m, gł. 0,5 – 1,2 m ; woda b. czysta; liczne schronienia dla ryb – zwalone konary drzew, łachy, bystrza, przegłębienia; dno piaszczyste, miejscami kamieniste; poj. płyty roślinności. Zbadano odcinek ok. 300 m. Stwierdzono: pstrąg potokowy (od narybku 0+ do dorosłych), głowacz białopłetwy (28 os.), jelec, lin (1 os. 1+), śliz (3 os.), minóg strumieniowy (1 os. larwa)



Fot. 1 i 2 Pstrąg potokowy i głowacz białopłetwy z Płynicy

4. **Rurzyca** – (53.273439 16.762116) szeroka (ok. 15-20 m) rzeką płynąca regularnym, ale naturalnym, płytkim (0,15-0,5 m) korytem w głębokiej dolinie rzecznej otoczonej lasem; woda bardzo czysta (najczystsza spośród analizowanych cieków), wartki nurt; dno kamieniste, tylko miejscami przy brzegu płyty szuwaru i dno piaszczyste. Stosunkowo uboga w siedliska dla większych ryb; liczne płyty roślinności typowej dla warunków lotycznych i pojedyncze zwalone drzewa. Zbadano ok. 350 m cieku. Stwierdzono: strzebla potokowa (bardzo liczna), pstrąg (0+), różanka (>50 os.), głowacz białopłetwy (31 os.), kiełb, jelec (0+).



Fot. 3 i 4 Różanka i narybek pstrąga potokowego z Rurzycy

5. **Piława – st. 1** – (53.257314 16.749013) - szeroka na ok. 12-15 m rzeka, o silnym nurcie; płynąca w obszarze leśnym; dno piaszczysto-kamieniste; gł. 0,7-1,5 m; zwalone drzewa; urozmaicona morfologia. Zbadano odcinek ok. 150 m. Stwierdzono: pstrąg potokowy, strzebla potokowa, głowacz białopłetwy (25 os.), ciernik **St. 2** – (53.243370 16.759130) - w ok. planowanego przecięcia z projektowanym wariantem trasy – rzeka płynie głęboką doliną, w środku dużego kompleksu leśnego; koryto się zwęża (ok. 10-12 m), pogłębia i zwalnia nurt; dno przy brzegu o dużej miąższości. Z uwagi na głębokość i muliste dno – odłów metodą brodzoną niemożliwy.
6. **Gwda** – (53.201047 16.786920) - duża, szer. na ok. 40 m rzeka, płynąca w głębokiej dolinie rzecznej, w otoczeniu lasu łęgowego; przy brzegu grząskie szuwary; płaty grążela żółtego; brak warunków do przeprowadzenia odłowów zakładaną metodą. Ocena ekspercka na podstawie obserwacji, danych literaturowych i danych z PMŚ.
7. **Głomia – st. 1** – (53.219382 16.792606) - poniżej piętrzenia/elektrowni w Dobrzycy; meandrujący, naturalny ciek; dno piaszczyste, miejscami kamieniste; pojedyncze głazy, liczne zwalone drzewa; bystrza, łachy, itp. Zbadano odcinek ok. 250 m. Stwierdzono: pstrąg potokowy, głowacz białopłetwy (11 os.), kiełb, brzana (1 os.), jelec, kleń, płoć.



Fot. 5 Brzana z Głomi st. 1

Głomia st. 2 – rzeka o naturalnym, urozmaiconym morfologicznie korycie; w miejscu planowanego przejścia wariantu trasy płynie w otoczeniu dużego kompleksu leśnego (wzdłuż brzegu las łęgowy), w bardzo głębokiej dolinie rzecznej, o trudnym dostępie; odłowy przeprowadzono wyżej w biegu rzeki w ok. m. Skórka Wybudowanie (53.209269 16.848944); dno piaszczyste, miejscami kamieniste, gł. 0,3-1,2 m; zwalone

drzewa; woda czysta. Zbadano fragment ok. 300 m. Stwierdzono: pstrąg potokowy, lipień (2 os.), głowacz białopłetwy (27 os.), piekielnica (38 os.), strzebla potokowa, kiełb, płoć, jelec, szczupak (2 os. ok. 1,5 kg)



Fot. 6 i 7 Pstrąg potokowy i lipień z Głomi st. 2

Głomia st. 3 (Dolnik) – (53.261001 16.922499) - wartki nurt, woda czysta; kor. 5-8 m; piaszczyste, miejscami kamieniste; gł. 0,3-1,5 m; dno urozmaicone, poj. płyty roślinności; otoczenie łąki i zadrzewienia. Zbadano odc. ok. 150 m. stwierdzono: kleń (liczny), pstrąg potokowy, głowacz białopłetwy (12 szt.), okoń, płoć, kiełb, piekielnica (30 os.)



Fot. 8 i 9 Kleń i piekielnice z Głomi st. 3

8. **Dopływ z Głubczyna** – suchy zarośnięty rów
9. **Strużnica** – j.w.
10. **Pękawnica – st. 1** – (53.298703 16.922577) - zamulony, śródpolny rów, o niewielkiej ilości wody (10-15 cm), szer. ok. 0,7 m. Stwierdzono niewielką populację cierniczka. **St. 2** – (53.289342 16.891808) - warunki zbliżone – ciernik, cierniczek; **St. 3** – (53.271335 16.865161) – suchy rów w obszarze leśnym.
11. **Dopływ z Tarnówki Wybudowy** – wąski (0,5-0,7 m) pól i łąk; bardzo płytki z przepływem; **St. 1** – (53.332227 16.896536) poniżej obiektu stawowego – bez ryb; **St. 2** (53.317868 16.907426) pośród pól uprawnych - cierniczek.
12. **Dopływ z Tarnówki - st. 1** (53.329780 16.872770) - suchy rów; **st. 2** – (53.311115 16.877778) - rów z niewielką ilością wody, bez ryb
13. **Dopływ z Węgierec** – (53.352377 16.900557)- suchy rów

Dziękuję za współpracę i kolejną możliwość przeprowadzenia odłowów badawczo-kontrolnych na Państwa wodach. Jestem pod wrażeniem piękna tych rzek, a zwłaszcza Płynicy, Rurzyca i Głomi. Mam nadzieję, że przekazane dane będą również pomocne również dla Okręgu.

Z poważaniem
dr inż. Maciej Czarnecki